EX LIBRIS · MILDRED BLISS · DUMBARTON OAKS
AT THE GATE OF DAWN

213 planches

# RECUEIL

## Des Plantes

## Les Plus Usuelles

## Peintes D'après Nature

PAR

LE S$^{r}$ PIERRE-DE SAVARY

&

Historiées

PAR

LE S$^{r}$ LOUIS-JOSEPH-DE CROIX

Apoticaire & Chimiste

A LILLE

# RECUEIL
# Des Plantes
# Les Plus Usuelles
# Peintes D'apres Nature

## TOME VIIII

L'AN M·D·C·C·L·X·X·I

I

# Rut de Chévre a Fleur Blanche

galega flore albo.

Elle a la même vertu que le galega vulgaris

(diadelphie decandrie)

3

Flox

5

# Violier

*Viola fruticosa*

7

8

# Monarda a Fleur Jaune

*monarda flore luteo.*

9

# alysson Blanc

alyjsson album.

11

# La Cardinale a Fleur Rouge

*rapuntium flore rubro*

13

# alKeKinge

alKeKingi bonaviendis bacca turbinata
phÿsalis - - - - - - - - (Linnæus 4: )

15

# Buphtalmum Maritime

buphtalmum maritimum. (Lin Sp 6 p:1274)

Elle croit communement sur les bords de la mer mediteranée

elle est vivace

(Syngénésie polygamie superflüe)

17

18

# Véronique Batarde
# a fleur Bleue

Veronica spuria flore cæruleo,

19

# Véronique Batarde
# a fleur Blanche

*Veronica Spuria flore albo.*

21

# Hieratium

*hieratium hortensis altissimas*

23

# Leonurus

leonurus cardiaca crispus.
leonurus cardiaca ( Lin sp 1 pag 817 )

elle est vivace

( didynamie gymnospermie )

25

# Lotier argenté

*lotus argentea.*

27

# Bistorte Globulifere

bistorta globulifera.

29

30

# Catanance

Catanance cærulea.
Chondrilla species 3a (Dodon pempt 638)

Son origine vient de L'isle de crête.

elle est annuelle

( Syngénésie polygamie égale )

31

# anagallis

anagallis morelli. [Lin Sp 2 pag 211]

elle est annuelle

(pentandrie monogyne)

33

# onatera

onatera biennis - - - - (linnaeus 2 p 297)

Son origine vient dela Virginie D'où on nous L'apporta en europe L'an 1614, elle y est maintenant commune

elle est bisannuelle

(octandrie monogyne)

35

# Origan

origanum heracleoticum. (Lin Sp 6: p 823)

elle est vivace

(didynamie gymnospermie)

37

# Pois Chiche Blanc

cicer arietinum album.

On cultive cette plante dans les jardins, elle pousse plusieurs tiges, grêles, ligneuses, dures, rameuses, un peu velüës, ses feuilles sont un peu velüës.

il succéde a sa fleur une gousse courte qui renferme des pois gros commes les pois communs, lesquels ont une figure qui approche de celle de la tête d'un belier, c'est pourquoi on appelle la plante cicer arietinum, ces pois sont de couleur blanche, il y en a aussi de couleur rousse, de couleur rouges et des noirs, ils ont un goût de pois ordinaire, de tous les grains qu'on a essayé pour faire une boisson qui imite le caffée, il n'y en a pas un qui ait si bien reussit que celuy la.
la racine de la plante est blanche.

Les pois seuls sont en usage en medecine les rouges sont preferés aux blancs, ils sont emolliens, chassent l'urine et le gravier.

(diadelphie decandrie)

39

# Stachis

Stachis orientalis alter

41

42

# Hieratium

*hieratium pilosum flore coccineo.*

43

# Cerastium

cerastium perfoliatum (Lin sp i paig 627 )
son origine vient de la grece,

elle est annuelle,

(decandrie pentaginie )

45

# Lÿchnis attrape-mouches

*lÿchnis muscipula.*

Cette plante croit aux bords des chemins, aux lieux incultes et secs.
elle pousse une tige ala hauteur d'environ pied etdemi, voide, rameuse, d'un goût leguminenx.

il succéde a ses fleurs un fruit qui contient des semences ménuës, rondes, rougeâtres,
saracine est blanche, ligneuse garnie de fibres.

il decoule desatiges une humeur visqueuse qui attache les mouches qui vont dessus, d'ou luy vient son nom d'<u>attrape-mouches</u>.
Cette plante est detercif et consolidante, en l'appli=
=quant ses feuilles sur la plaÿe

47

# Chenopodium

Chenopodium virgatum - - (Linæus)
chenopodiomorus minor
atriplex fructu mori
blitum virgatum (Lin: sp 2 pag 7)

Elle croît communement dans la tartarie et en espagne

elle est annuelle.

(monandrie digyne)

49



2

# Gramen

gramen Spicatum junci facie lithospermi Semine
( Tournefort 518 )

Schœnus nigricans ( Linnæi species 43 )

51

# Capucine a Fleur Double

Cardamindum flore duplici.

53

# Cotula

## a feuille de Coronopus

cotula coronopi folio (Lin Sp 3 pag 1257)

Son origine vient de L'æthiopie

elle est annuelle

(Syngénésie polygamie Superflue)

55

# Glaucium
## a fleur Violette

glaucium flore violaceo. (Tournefort)
glaucium cornutum flore violaceo. (gerard)
papaver corniculatum violaceum (J. Bauhin)
chelidonium hybridum (Lin Sp Pl pag 724)

Cette plante croit dans les champs, entre les bleds.
Ses feuilles sont tendres, un peu veluës.
il succede a ses fleurs des gousses longues, du=res, veluës, renfermant des semences fort menuës, de couleur obscure ou noiratre,
Sa racine est menuë;
elle est annuelle
Elle est resolutive, étant appliquée exte=rieurement.

(polyandrie monogynie)
elle a 3 Stigmates.

57

# Cÿnoglosse
## a feuille de lin

Cÿnoglossum lini folium (Lin Sp 5 p 193)

Elle est commune en portugal

elle est annuelle

(pentandrie monogÿne)

59

# Thlaspi des Champs

thlaspi arvense (Lin Sp 2 p 901)
thlaspi Latius (Dodon pempt 712)

elle est annuelle

(tetradynamie siliculeuse)

71

I

# Campanule

Campanula Speculum Veneris dicta flore cæ=
=ruleo.
Campanella Speculum Veneris (Lin Sp 31 p 238)

elle est annuelle

2

C'est une variété de la précédente

(pentandrie monogyne)

73

# Androsace

androsace maxima. (Lin: Sp: pag 203)

Cette plante croit aux lieux maritimes, entre
les bleds et dans les bois.

elle pousse plusieurs tiges a la hauteur d'environ
demi pied, velües,

il succede a ses fleurs un petit fruit spherique
gros comme un pois contenant plusieurs semences
rougeâtres, et longuettes,

sa racine est menüe et fibreuse.

elle est annuelle

Elle est propre pour l'hidropisie et la goutte
on en prend l'infusion.

(pentandrie monogÿnie)

75

# Hieratium

hieratium flore suave rubente.

77

Matricaire
a fleur Double

matricaria flore duplici

79

# Matricaire
## a feuilles frisées

matricaria foliis crispis

81

# Medicago

medica flavo flore leguminoso, fructu echi=
=nato minore, foliis cordatis maculatis.

83

# Medicago

medica flore luteo leguminoso, fructu echi-
=nato, folio macula fusca
trifolium floribus flavis, fructu echinato, folio
leviter dentato, macula fusca.

85

# Medicago

*Medicago Orbicularis.*

87

# Oseille De L'amerique

rumex vesicarius. (Lin Sp 16 pag 479)

elle est annuelle

(hexandrie trigynie)

89

# Sauge Tricolor

*Salvia tricolor.*

91

1

2

I

# Le Pain a Coucou D'éthiopie

oxijs æthiopicus

2.

# Polÿcarpon

polijcarpon tetraphijllum. (Lin Sp 1 pag 131)

elle est commune en italie

elle est annuelle

(triandrie trigijne)

93

# Aster

bellis ramosa umbellifera cornuti canad 193
aster annuus - - - - - (lin. spec. 1229)

elle est commune au canada

elle est annuelle

(Syngénésie polygamie superflue)

95

# La Bellevedere

*chenopodium linifolio*
*chenopodium Scoparia* (Lin Sp 1 6 p 321)
*osyris* (dodon pempt 101)

Elle croit communement en grèce, au japon, a la chine,

elle est annuelle

(pentandrie digyne)

97

# Dracocephalum

Dracocephalum canescens –[lin Sp 1Ø· ]
dracocephalum floribus verticillatis, bracteis
oblongis: serratis spinosis, foliis subtomento=
=sis. - - - - - - - - - - [Hort ups 66]
dracocephalum floribus verticillatis, foliis lan=
=ceolatis, floribus oblongis.
moldavica orientalis, betonicæ folio, flore
magno violaceo. (Tourn cor II ]

Son origine vient de l'orient.

elle est annuelle

(didynamie gymnospermie)

99

# Verge D'or Du Mexique

*Virga aurea mexicana limonifolio* (B: 2.)
Solidago - - - - - - (R: i l: 6: ) p 1234

Elle est commune au mexique

elle est vivace

(Syngénésie polygamie Superflue)

101

# Chardon

Carduus eriophorus. (Lin sp 16 pag 1153)
Carduus tomentosus corona fratrum herba=
=riorum -- (Lobellii icones 2 p 9 )

elle est bisannuelle

(Syngénésie polygamie égale)

103

# Patience de Mer

rumex maritimus. (Lin Sp 9 pag 478)

Elle croit en europe, sur les bords de la mer

(hexandrie trigyne)

105

# Rudbeckia

rudbeckia foliis dissectis ( tournef )
rudbeckia foliis inferioribus trilobis, superioribus indivisis. [Lin sp 2 ]
rudbeckia triloba - - - - [Lin sp 2 ] p 1280
rud beckia foliis trilobis [gronovius virg 180]
chrysanthemum cannabinum virginianum hir=
=sutum, disco magno petalis aureis radiato.
[plukenetii almagestum phytographia 100
T 22. f: 2 ]
chrysanthemum annuum majus virginianum foliis laciniatis et hirsutis, umbone nigricante.
[Moris histor 3 p: 19 ]

Son origine vient de la virginie *

elle est bisannuelle

(Syngénésie polygamie fausse)

* contrée de l'amérique septentrionale; elle produit du tabac en abondance, les naturels du pays vont nus, et ont au dos la marque du seigneur a qui ils appartiennent, ce pays appartient aux anglois.

# Grande Pimpernelle
## du canada

pimpinella major canadensis
pimpinella maxima canadensis longius spica.
pimpinella sanguisorba canadensis major spica longiore alba. [moris hist 3]
sanguisorba spicis longissimis [hortus cliffortianus 39]
sanguisorba canadensis [lin sp 3] p169)

Son origine vient du canada.

elle est vivace

(tetrandrie monogynie)

109

# Martinia

martinia flore albo / annua

les francais l'appellent Le cornard —
français

jii

# Scabieuse

*Scabiosa*

113

# Scabieuse

Scabiosa

115

# Scabieuse

*Scabiosa ukrenaria*

Son origine vient du paijs d'ukraine contrée d'euro=
=pe aboutissant a la pologne et a la moscovie, c'est le
meilleur paijs d'europe, on l'appelloit autrefois terre
de lait et de miel, Ces peuples qui l'habitent sont ap=
=pellés cosaques.

# Scabieuse

Scabiosa

119

# Scabieuse

Scabiosa Stellata. (Lin Sp 15 pag 144)

elle est annuelle

(tetradynamie monogyne)

121

# Scabieuse

*Scabiosa*

123

# Scabieuse

Scabiosa

125

# Scabieuse.

Scabiosa

127

# Scabieuse

*Scabiosa*

129

# Scabieuse

Scabiosa

131

# Scabieuse

*Scabiosa*

1
2

I

## Silene

Silene quinque Vulnera. (Lin Sp 3 p 595)

elle est annuelle

(decandrie trigyne)

2

## Silene

Silene Serastoides. (Lin Sp 6 pag 596)

elle est annuelle

(decandrie trigyne)

185

# Potentilla

potentilla flore aureo. (1)
potentilla flore pallido. (2)

137

# Tanesie D'afrique

tanacetum africanum fruticans multiflorum foliis tanaceti vulgaris decuplo minoribus,

Son origine vient d'afrique d'ou sa semence a été apportée en europe l'an 1699.

sa racine est ligneuse et blancheâtre.

sa tige est ronde et s'éleve a la hauteur de pied et demi.

.

Son goût est semblable a celuy de la tanesie or=dinaire.

139

# Tanesie D'afrique

tanacetum africanum arborescens foliis lavan:
:dulæ multifido foliis.

Son origine vient d'afrique.
Sa racine est ligneuse.
Sa tige est ronde et s'élève a la hauteur
de six a sept pieds.
Son odeur approche de celle de la tanesie,
elle fleurit en juin et juillet.

# Trèſle D'afrique

trifolium africanum frutescens folio angustio=
=re flore rubente.

Son origine vient d'afrique d'où sa semence
a été apportée en europe l'an 1698
sa racine est petite, ligneuse,
sa tige s'élève a la hauteur d'environ un pied
et demi, ronde.

il succède a sa fleur une silique qui renferme
une semence reniforme de couleur brune.

143

# Trèfle D'afrique

trifolium africanum fruticans foliis incanis flore luteo.

Son origine vient d'afrique d'où sa semence a été apportée en europe sous le nom de genista africana glomerato flore luteo elle croit com=
=munement aux lieux pierreux du cap de bonne espérance où elle fleurit en octobre.

sa racine est ligneuse.

sa tige est ronde et s'éléve a la hauteur de deux pieds

elle fleurit en juillet et aoust dans ce climat.

il succède a ses fleurs des siliques contenantes chacune une semence réniforme.

145

# Valerianelle D'afrique

Valerianella africana fruticans, foliis longis et angustis.

Son origine vient d'afrique.
elle a beaucoup de racine, de couleur brûne.
Sa tige est ronde et s'élève a la hauteur de pied et demi,
ses fleurs sont monopétales.
elle fleurit en juillet et aoust en ce climat.
il succéde a sa fleur une semence unique, oblongue.
son goût est un peu amer avec un peu d'as=
=triction.

j47

# Verveine D'amerique

Verbena americana veronicæ foliis flore coccineo spicato breynii.
Katou Karva (par les malabares )

Son origine vient de l'amerique

Sa racine est ligneuse, brune, et ses fibres blanchâtres,

Sa tige est ronde, d'abord verte, puis brune, elle fleurit en aoust,

Son goût est astringent accompagné d'amer= itume,

elle croit communement dans l'isle aruba en la partie septentrionale de l'amerique.

149

# Lys De Zeilan

lilium Zeilanicum Superbum.

Son origine vient de l'isle de Zeilan, ses tiges sont sarmenteuses et s'élèvent a la hauteur d'environ trois coudés, rondes, ver=dâtres, de la grosseur d'une plume a écrire, elles pourrissent tous les ans, mais sa racine en repousse de nouvelles au printems,

Ses fleurs sont sans odeur, il leur succede des capsules qui renferment des semences rougeâtres.

Sa racine est assez grosse, ploiée ordinairement comme une équerre, aijant quelque fibres capillaires, blanche en dedans, brune au dehors.

151

# Lilionarcisse de Ceïlan.

*lilio-narcissus ceijlanicus latifolius, flore niveo externe linea purpurea striato. tolabo Ceijlanensibus (par bat prod )*

Son origine vient de l'isle de ceylan.
Sa racine est bulbeuse, blanche, oblongue, garnie de beaucoup de fibre, lannugineuses.
Ses feuilles ont un goût d'amertume et ont ordinairement deux pieds de long.
elle fleurit en juin dans notre climat.
Ses fleurs ont une odeur de muguet, il leur succedes des capsules triangulaires qui con=tiennent des semences.

153

# Amarillus

amarillus lilio-narcissus indicus flore ex albo exterius rubente.

(hexandrie monogynie)

155

# Lys de S^t Jacque

lilio-narcissus flore sanguineo nutante
(R et L. 3)
amarillis spatha uniflora, corolla inæquali,
genitalibus declinatis — (hortus upsaliensis 75)
lilionarcissus jacobæus flore sanguineo nutan-
-te — — — — — — — — (dillenii elthamenses. 195
t: 162 · f: 196)
narcissus jacobæus major (vid h elys 2 p 89)
amaryllis formosissima [lin sp 3 f 10]

Son origine vient de l'amerique meridionale
elle ne fut connut en europe qu'en l'année
1593

elle est annuelle

[hexandrie monogynie)

# Narcisse de Ceïlan

narcissus Ceïlanicus flore albo hexagono odo=
=rato
pancratium Zeilanicum (Lin Sp 1 pag 417)

Son origine vient de l'isle de ceïlan.

Ses racines sont bulbeuses.
elle fleurit en juillet dans notre climat.
sa fleur est monopetale, et rend une tres bon=
=ne odeur, il luy succède des semences rousses,
anguleuses, enfermées dans une capsule divisée,
en trois loges.

elle est vivace

(hexandrie monogynie)

159

# Narcisse D'amboine

Narcissus amboinensis folio latissimo rotun=
=do floribus niveis inodoris.

Son origine vient d'amboine ile d'asie, l'une des moluques, dans les indes orientales. *
Sa racine est bulbeuse, oblongue, blanche, jettant de gros fibres.
Ses feuilles sont insipides au goût
Sa tige est ronde, tendre,
Ses fleurs sont inodores, ordinairement au nombre de dix ou douze
il leur succéde des capsules triangulaires
elle fleurit en juin
elle demande beaucoup de chaleur pour sa culture.

(hexandrie monogyne)

* cette ile abonde en cloud de girofle.

161

# Narcisse D'amerique

narcissus americanus flore multiplici albo, exagono, odorato.
pancratium caribæum (Lin sp 3. p418)
Son origine vient de l'amerique,
Sa racine est bulbeuse, grosse comme le poing,
Sa tige ne s'éleve qu'en juin,
elle fleurit en juillet, et aoust.
Ses fleurs ont une odeur agréable,
Ses feuilles sont longues de deux pieds.

elle est annuelle

(hexandrie monogÿne)

163

# Hiacinte D'afrique

hyacinthus africanus tuberosus flore caeruleo umbellato. _ _ . . ( breynii prod 1 )
crinum africanum (Lin sp 4 pag 419 )
Son origine vient d'affrique
Sa racine est tubereuse,
Sa tige est ronde, nuë, haute de trois pieds, creuse.
elle fleurit au mois d'aoust, elle n'a point d'odeur.
il Succede a ses fleurs des capsules divisées en trois loges, renfermant plusieurs semences,
cr

elle est annuelle

(hexandrie monogynie)

165

# Ketmia D'amerique

Ketmia americana urens annua flore luteo fructu piramidali Sulcato.

Son origine vient de l'amerique d'où sa Se=
=mence a été apportée en europe

Sa racine est blanche et fibreuse

Sa tige s'éleve a la hauteur d'environ pied et demi,

elle fleurit en juin et juillet,

il Succede a sa fleur une capsule qui contient des Semences grises.

Toute la plante est velue et piquante comme l'ortie.

167

# Lotus
## De L'isle de St Jacque

Lotus angustifolia flore luteo purpurascente insula Santi jacobi
lotus jacobaeus (Lin Sp 10 pag 1091)
Son origine vient du cap de bonne esperance d'ou sa semence fut apportée l'an 1699, elle croit communement dans l'isle St jacque près du cap.
Sa racine est blanchâtre et a des fibres fort menues.
Sa tige est haute de deux pieds.
il succede a sa fleur une silique contenante six ou sept semences jaunâtres et luisantes.

(diadelphie decandrie)

169

# Lÿchnis des indes

lijchnis indica Spicata ocijmastri foliis fruc:
:tibus lappaceis oblongis, radice urente.
plombago Zeilanica (Lin Sp 2 pag 215)
Son origine vient de l'isle de Zeïlan d'ou
Sa semence a été apportée en europe
Sa racine est fibreuse, brune, d'un goût brû:
:lant comme celle de la pijrêtre.
Sa tige S'élève a la hauteur d'environ pied
et demi.

(pentandrie monogijne)

171

# Ornitogalum d'afrique

ornithogalum africanum, plantaginis
rosea folio, radice tuberosa.
ornithogalum capense (Lin Sp II p 441)

Son origine vient du cap de bonne es=
=perance, d'ou sa racine fut apportée
en europe l'an 1698.

sa tige s'éleve a la hauteur de deux pieds,
nüe, ronde,

il succéde a ses fleurs des capsules trian=
=gulaires divisées en trois loges, renfer=
=mant des semences rondelettes.

elle est vivace

(hexandrie monogyne)

173

# Elichrisum D'afrique

elichrisum africanum latifolium foetidum capitulo aureo.

Son origine vient du cap de bonne esperance ou elle fleurit en octobre.

Sa racine est fibreuse,

Sa tige est ronde et fongueuse, haute de trois ou quatre pieds.

elle fleurit en juillet et aoust en ce climat.

il Succede a ses fleurs des Semences rou=geâtres aigrettées,

elle a l'odeur de l'arroche puante.

175

# Elichrysum D'afrique

elichrysum frutescens africanum foliis chrithmi marini

Son origine vient d'afrique,
sa racine est grosse, brune, garnie de fibres blanchâtres
sa tige est ronde et s'élève quelquefois jusqu'à cinq pieds de haut, selon la culture.

il succède a ses fleurs des semences aigrettées.

177

# arbrisseau D'afrique

frutex africanus ericæ folio glutinosus flore
Spicato albo

Son origine vient d'afrique
Sa racine est ligneuse, blanche, sa tige est ronde
elle fleurit en été.
Ses fleurs Sont monopétales

179

# Hÿpericum de Canarie

hÿpericum frutescens latifolium canariense multiflorum.
hÿpericum canariense (Lin Sp. 8 p:1103)
Son origine vient des isles de canaries d'ou sa semence a été apportée en europe.
sa racine est ligneuse et garnie de fibres.
sa tige est ronde, ligneuse, et s'éleve a la hauteur d'environ trois pieds.
elle fleurit toute l'année si l'on a soin de l'in=:fermer dans la serre, aux premiers froids
il succede a sa fleur des capsules divisées en plusieurs loges renfermant de petites semences.

(poliadelphie polyandrie)

181

# Jacobé D'afrique

jacobea africana frutescens foliis absinthii umbelliferi incanis
othonna coronopi folia (Lin Sp 5 p 1310)
Son origine vient d'afrique d'ou la semence a été apportée en europe l'an 1699.

Sa racine est fibreuse,

Sa tige est ronde, grosse comme le doigt.

elle fleurit en juin et juillet,

Sa fleur pue mais ses feuilles sentent la carotte.

Ses semences sont oblongues, rougeâtres et aigrettées,

elle se produit par la semence et par bouture;

(Syngénésie polygamie necessaire)

183

# Jacobé D'afrique

jacobea africana frutescens, coronopi folio.
othonna coronopi folia Lin sp 5 p 1310)

Son origine vient d'afriques,
Saracine est fibreuse, blanchâtre.
Satige est ronde,
Ses Semences Sont aigrettées,
ellefleurit en aoust.
ellemultiplie par Sa Semence et par bouture.

(Syngénésie poligamie nécessaire)

185

# Jacobé D'afrique

jacobea africana frutescens lavendulæ
foliô latiori,
Senecio Longifolius (Lin Sp 74 p 1222)
Son origine vient d'afrique.
Sa racine est ligneuse, brune.
elle fleurit toute l'année,
ses semences sont aigrettées.
Ses feuilles étant machées ont un goût de
carottes;

(Syngénésie polygamie superflüe)

187

# Jacobé D'afrique

jacobea africana frutescens folio longo et glauco.
Senecio rigens (Lin Sp 38 pag 1224)
Son origine vient d'afrique d'ou sa semence fut apportée en europe l'an 1698.
sa racine est blanche et fibreuse.
sa tige est ronde et s'élève a la hauteur d'en=viron trois pieds.
elle fleurit en juillet et aoust.
ses semences sont aigrettées.
ses feuilles sont un peu âcre au goût.

(Syngénésie polygamie superflue)

189

# Jacobé D'afrique

jacobea africana hederæ terrestri folio repens.
cineraria geifolia (Lin Sp i pag 1242)
Son origine vient d'afrique dou sa semence a été apportée en europe l'an 1697.

Sa racine est petite, blancheâtre.

sa tige est ronde.

elle fleurit en juillet et aoust dans ce climat

Ses semences sont aigrettées.

elle croit naturellement aux lieux ombâgeux du cap de bonne esperance, ou elle fleurit au mois d'octobre.

elle est vivace

(Syngénésie polygamie superflue)

191

# Jacobé D'afrique

jacobea africana frutescens crassis et Succulentis foliis.

Son origine vient d'afrique

Sa racine est ligneuse,

Sa tige est ronde, ligneuse, et s'élève a la hauteur d'environ pied et demi.

Ses feuilles Sont assez épaisses et Succulentes.

Son goût est un peu Salé

elle fleurit en été

Ses Semences Sont aigrettées.

elle se reproduit par semence et par bouture.

193

# Jacobé D'afrique

jacobea africana frutescens foliis rigidis et hirsutis.
Senecio rigidus (Lin Sp Pl pag 1221)
Son origine vient d'afrique d'où sa Semence a été apportée en europe l'an 1697.
Sa racine est fibreuse.
Sa tige est ronde.
elle croit a la hauteur de sept a huit pieds.
Ses feuilles Sont roides.
elle fleurit en aoust et Septembre.

Ses feuilles ont un goût therebentiné un peu aromatique.

(Syngénésie poligamie Superflue)

195

# Solanum D'afrique

Solanum lignosum africanum Semper virens laurinis foliis.

Son origine vient du cap de bonne esperan=
=ce, ou il croit aux lieux Sablonuex.

La racine de cet arbrisseau est blanchâtre et grosse comme le petit doigt.

Sa tige a deux écorces la prémiere brûne, et la deuxième verte.

elle fleurit au cap dans le mois de Septembre

il Succéde a Ses fleurs des baies qui con=
=tiennent des Semences blancheatres.

197

# Coma-aurea D'afrique

Coma-aurea fruticans omnium maxima fo=
=liis tomentosis et incanis
(athanasia pubescens Lin Sp 8 pag 1182)

Son origine vient d'afrique d'ou sa semence
a été apportée en europe en 1696

Sa racine est brûne et ligneuse.

Sa tige est ligneuse et s'élève ala hauteur
d'environ ~~trois~~ pieds

elle fleurit en juillet et aoust.

il succede a ses fleurs des semences a aigrettes,

(Syngénésie polygamie égale)

199

# Coma aurea D'afrique

coma aurea africana fruticans ericæ folio,
chrysocoma ciliata (Lin Sp 4 pag 1177)

Son origine vient d'afrique d'ou sa semence
a été apportée en europe l'an 1698.

Sa racine est petite et ligneuse,

sa tige est ronde, et s'élève a la hauteur d'en=
=viron pied et demi.

elle fleurit en juin et juillet dans ce climat,

ses semences sont aigrettées.

ses feuilles frottées entre les doigts, rendent une
odeur de carotte sauvage.

étant machées elles ont un goût therebenti=
=neux aromatique,

(Syngénésie polygamie égale)

201

# Coma aurea D'afrique

coma aurea africana fruticans foliis glau:
:cis et in extrémitate trifidis
athanasia trifurcata (Lin Sp 6 pag 1181)
Son origine vient d'afrique d'où sa semence
a été apportée en europe l'an 1697
cet arbrisseau fleurit en aoust et septembre.
sa tige s'élève a la hauteur d'environ pied et
demi, ronde.

ses semences sont aigrettées.

(Syngénésie polygamie égale)

203

# Coma aurea D'afrique

coma aurea africana fruticans foliis crith=
=mi marini.
athanasia chrithmi folia (Lin Sp 7 p 1181)
Son origine vient d'afrique.

la racine de cette plante est ligneuse, de
couleur brune.

Sa tige est ronde, ligneuse, et s'élève a
la hauteur d'environ six pieds.
elle fleurit en aoust et septembre dans ce climat,
ses semences sont a aigrettes

(Syngénésie polygamie égale)

205

# Cÿtise de Canarie

cytisus canariensis Semper virens et incanus.
genista Canariensis (Lin Sp 1 pag 997)

Son origine vient des isles de canaries d'ou sa semence a été apportée en europe.
la racine de cet arbrisseau est ligneuse,
sa tige s'élève a la hauteur d'environ 7 pieds, ronde, grosse comme le petit doigt.

il succede a ses fleurs des siliques petits, velus et plats lesquels contiennent des semences plattes et oblongues.

(diadelphie decandrie)

207

# echium

échium africanum frutescens foliis pilosis
echium Africanum fruticans foliis pilosis
echium fruticosum (Lin Sp I) pag 199 )

Sa racine est ligneuse, brune et fibreuse,
Sa tige s'élève a la hauteur d'un pied, ronde
et grosse comme le pouce.
Ses fleurs sont monopétales.
il succède a sa fleur quatre semences noires.
elle fleurit en may et juin.
Son origine vient d'afrique elle croit commu=
=nement au cap de bonne espérance
ou elle fleurit au mois d'octobre.
elle croit par semences et par bouture.

(pentandrie monogyne)

# Campanule D'afrique

campanula africana annua latis serraticque foliis flore magno violaceo.

Sa racine est fibreuse,
sa tige est ronde,
elle fleurit en aoust et septembre dans ce climat,
il succede a sa fleur une capsule divisée en trois loges contenantes de petites semences.

elle rend un suc laiteux et aqueux.

(pentandrie monogijnie)

211

# Campanule D'afrique

Campanula africana annua glabra, Serra=
=to folio, flore pallido.

Son origine vient du cap de bonne espé=
=rance d'où la semence a été apportée l'an
1698.
sa racine est menuë et fibreuse,
Sa tige est ronde
elle fleurit en aoust et Septembre.
il Succède a ses fleurs des capsules divisées en
trois loges. contenantes des Semences très menuës,
elle rend un suc aqueux et laiteux.

213

# Campanule D'afrique

campanula africana hirsuta parvo angusto=
=que folio, flore pallide violaceo.

Son origine vient d'afrique d'où sa semen=
=ce a été apportée en europe l'an 1698.

sa tige est ronde et velüe;

sa racine est fibreuse, petite et blanche;

il succéde a sa fleur une capsule a trois coins
contenante des semences très menuës.

215

## Campanule[1] D'afrique

campanula africana annua angustifolia, flore purpurascente major.

il succede a sa fleur une capsule divisée en trois loges, remplies de semences ménues, rougeâtre.

elle fleurit en juin et juillet

## Campanule[2] D'afrique

campanula africana annua angustifolia flore purpurascente, minor.

cette plante ne differt de la susdite, qu'en ce qu'elle est plus petite en toute ses parties.

217

# Campanule D'afrique

campanula africana frutescens aculeosa flore violaceo.
roella ciliata (Lin. Sp. 1 pag 241)

Son origine vient d'afrique d'ou sa semence a été apportée en europe l'an 1698

il succéde a sa fleur une capsule qui contient des semences menuës.

elle est vivace

(pentandrie monogijne)

219

# Camphorata D'afrique

camphorata africana umbellata frutes=
=cens hermani.

L'origine de cet arbrisseau vient d'afrique,
ses racines sont fibreuses,
ses tiges sont ligneuses, rondes,
sa fleur est monopétale.
elle fleurit en aoust,
il succède a ses fleurs des petites semences
jointes deux a deux raiyées sur le dos.

221

# Cistus

Cistus ledon flore macula nigricante no:
=tato - - - - - - - - - - - { j: bauhin }
cistus ladaniferus (Lin sp 5 pag 737) }

Cette plante est commune en espagne et
en portugale
sa tige s'élève a la hauteur d'un homme et
jette beaucoup de rameaux ligneux.
elle fleurit en juin et juillet dans ce climat.
il succède a ses fleurs des capsules divisées
en deux loges qui renferment beaucoup de
semences très menues, de couleur roussâtres.
elle demande beaucoup de chaleur et veut
être souvent arrosée.

(polyandrie monogynie)

223

# Pourpier D'afrique

portulaca africana Sempervirens flore ru=
=bicundo
portulaca anacampseros Lin Sp h p 639 )

Sa racine est blanchâtre.

Sa tige est ronde, et Se couche a terre.

Ses feuilles Sont épaisses, Succulentes.

il Succéde a Ses fleurs des capsules qui contien=
=nent plusieurs Semences, pétites, pâles.

Son goût est comme celuy du pourpier ordinaire.

elle est toujours verte.

elle multiplié par Sa semence et par bouture.

elle aime d'être cultivée comme l'aloës.

elle croit communement au cap de bonne espé=
=rance.

( dodecandrie monogijne )

225

# Pourpier D'amérique

portulaca americana latifolia erecta
floribus albis . . . . . [ parad batav ]
portulaca paniculata (Lin Sp 6 pag 640)
Son origine vient de l'amerique.

Sa racine est blanche et fibreuse.

Sa tige est toujours droite, et ne s'éleve qu'a la hauteur d'environ pied et demi, le haut de laquelle se divise en rameaux.

Ses feuilles sont épaisses et succulentes.

Son goût est auster.

elle fleurit en juillet dans ce climat.

il succede a sa fleur une capsule oblongue et pointue, qui etant mure s'ouvre horisontallement et laisse paroître une quantité de semences

elle est annuelle.

(dodecandrie monogynie)

227

# Pourpier

Sesuvium portulacastrum (Lin sp i p 684)

portulaca curassavica, angusto, longoque folio procumbens foliis rubris. (par bât. jard.)

Sa racine est blanche, rameuse et fibreuse.

Ses feuilles sont fort succulentes et luisantes.

Son goût est un peu auster.

elle fleurit en été.

il succède a ses fleurs, une capsule qui étant meur, s'ouvre horisontalement et repend de petites semences roussâtres.

elle est annuelle

(icosandrie pentagyne)

229

# Spartium D'afrique

Spartium africanum frutescens ericæ folio.
polijgala heisteria (Lin Sp 15 pag 989)

Son origine vient d'afrique

Sa racine est ligneuse,
Sa tige est ligneuse, grosse comme une plume
a écrire. et s'élève ala hauteur dedeux ou trois
pieds.

il Succéde a Ses fleurs une silique qui contient une
seule Semence réniforme

elle multiplie par Semences et par bouture

(diadelphie octandrie.)

231

# alcea D'amérique
ou de Surinam.

alcea americana annua flore albo, ma=
=ximo, fructu maximo pyramidali Sulcato,
hibiscus esculentus (Lin Sp ig pag 980)

Sa Semence a été apportée de Surinam *
en europe,
Sa racine est blanche, fibreuse,
Sa tige S'éléve a la hauteur d'environ deux
pieds
Ses fleurs Sont inodores
il Succéde a Ses fleurs des capsules rayées,
longues, grosses, droites, lesquelles contien=
=nent des Semences prèsque rondes, de cou=
=leur grise noirâtre, dont la moëlle est blan=
=che et farineuse,
elle se Sème tous les ans.
cette plante demande beaucoup d'eau et
de Soleil pour Sa culture,

* Surinam est un päis de l'amerique dans
la terre ferme; c'est une colonie des hollandois,

(monadelphie polyandrie)

233

# alcea de Bengale

alcea bengalensis spinosissima, acetosæ sa=
=pore flore luteo pallido umbone purpurascen=
=te
hibiscus cannabinus (Lin Sp 15 p: 979)
Son origine vient de bengale, roijaume d'asie
dans les indes.
Sa racine est blanche, ligneuse, jettant beau=
=coup de fibre,
Sa tige est de couleur herbeuse
Ses feuilles ont un goût d'ozeille et sont un
peu velüe,
il succède a ses fleurs des capsules, qui étant
meurs s'ouvrent en cinq parties et laissent
paroître des semences reniformes, roussâtres

elle se seme tous les ans.

(monadelphie polijandrie)

275

# aster D'afrique

aster africanus frutescens foliis angustis et plerumque conjunctis.
aster fruticosus (Lin Sp 5 pag 1225)

Son origine vient d'afrique ou elle croit vo:
:lontairement aux lieux montagneux. et pierreux
elle y fleurit au mois d'octobre.

Ses racines sont ligneuses et fibreuses.

Sa tige est de la grosseur du pouce, ridée,
haute de pied et demi

il succede a ses fleurs des semences a aigret:
:tes,

elle fleurit en mars et avril en ce climat.

toute la plante a un goût aromatique

(Syngénésie polygamie superflüe)

237

# aster D'afrique

aster africanus frutescens splendentibus, sarris et reflexis foliis.
gorteria squarrosa Lin Sp 2 pag 1284)

Son origine vient d'afrique.
Sa racine est blanche et ligneuse.
Sa tige est ronde et velue
elle fleurit en mars dans ce climat.
Ses semences sont aigrettées.

Son goût est un peu salé

on conserve rarement cette plante l'hiver, sur-
-tout lorsqu'elle a produit sa fleur.
on la multiplie par semences et par bouture.

(Syngénesie polygamie fausse)

239

# aster D'afrique

aster africanus frutescens lavendulæ folio – flore purpureo.

Son origine vient d'afrique,
Sa racine est ligneuse et fibreuse,
Sa tige est ronde et s'élève a la hauteur d'en=
=viron pied et demi
elle fleurit en été.

Ses semences sont aigrettées,

elle a un goût aromatique .

241

# Balsamine des indes

balsamina cucumerina indica fructu majore flavescente, — pandi-pavel. [hort malab )
momordica charantia (Lin Sp 2 pag 1433)
Son origine vient des indes.
Sa racine est fibreuse,
Ses fleurs sont inodores.
Son fruit dans sa maturité, s'ouvre par la pointe, et laisse paroître une pulpe fongueuse,
Ses semences sont oblongues, brûnes, un peu pointues. contenantes un noijau blanc un peu amer.
cette plante est annuelle.
Sa culture demande beaucoup de chaleur.
Les indiens se servent de ses feuilles au lieu de houblon pour faire la bière.

La decoction de ses feuilles est propre contre les vers.

(monoecie syngénésie)

# Ricin D'amerique

ricinus tithymaloïdes americanus lactescens, et urens floribus albis [parad bat prod] jatropa urens (Lin Sp 6 pag 1429)

Son origine vient d'amérique,

Sa racine est blanche, pleine de suc blanc comme du lait, d'un goût âcre.

elle fleurit en juillet,

il Succède a ses fleurs une capsule divisée en trois loges qui renferme trois Semences Semblables a celles du ricin ordinaire, d'un goût âcre.

on la conserve l'hiver dans les serres,

(monoecie monadelphie)

245

# Geranium

geranium malvæ folio laciniato odore melissæ
geranium africanum frutescens malvæ folio
laciniato odorato [herm lugdb 277. t 278]
geranium americanum arborescens erütis folio,
odore melissæ (lin spec 12 ]

Son origine vient d'afrique.

(monadelphie decandrie)

247

# Geranium

geranium biflorum
geranium pedunculis biflovis, hirsutum, folio malvæ maculato, laciniato.

249

# Geranium

geranium africanum alchimillæ folio hir=
=suto flore rubro magno.

251

# Geranium

geranium africanum frutescens alchimillæ folio floribus rubicundis. [lin spec ii]

Son origine vient d'afrique.

253

254

# Geranium

geranium africanum frutescens alchimillæ folio, flore rubello purpurascente.

255

# Geranium

geranium anemone folio flore rubello.

257

# Geranium a Feuille de Vigne

geranium africanum, noctu olens, tuberosum, foliis vitis hirsutis
geranium noctuolens vitis folio (R: 18: L. I)
geranium lobatum (Lin Sp 23 pag 950)

Son origine vient d'afrique d'ou Sa racine fut ap=
=portée en europe l'an 1698.

Sa racine est tubereuse,

Sa tige est ronde,

Sa fleur a une odeur assez agréable qu'elle ne rend que quand le soleil n'est point sous l'horison,

il Succede a Ses fleurs une Silique qui a la figure du bec d'un oiseau, renfermant des petites Semences.

elle fleurit en juillet et aoust.

(monadelphie decandrie)

# Geranium

geranium batrachoïdes.

261

# Geranium Panaché des Forests

*geranium Silvaticum paniculatum.*

263

# Geranium

geranium folio malvæ maculatum

265

# Geranium
# a Fleurs Couleur de Rose

geranium flore roseo.

267

geranium gruin...

Quintefeuille
ou Potentille rampante
Potentilla reptans.
Rosacées [illegible]

## lvi, Geranium.

geranium gruinum.

Iri. Geranium.

geranium gruinum.

# Iris

iris – gout-geele.

271

iris - Feuille - Morte

273

Iris

275

iris-Mort-Lion.

277

iris- Feuille- Morte. Croon.

279

Le Roÿ du Pérou Bleuë

281

# iris

iris anglica.

283

# Iris

*iris hispanica regina*

285

# iris

iris anglica.

on L'appelle communement en françois polijm
=nestre fond blanc picté .

287

# Iris

*iris hispanica.*

289

1

## iris

hermodactilus
iris bulbosa folio tetragono.

2

## iris

iris virginiana pumila flore purpureo cæ=
=ruleo odorato. ( M: 53 )

291

# atropha

*atropha americana flore cæruleo.*

293

# Tithÿmale a Feuille de Pin

tithÿmalus pini folio.

295
1
2

1

## ixia

ixia caule bulbifera toto albo.
ixia bulbifera (Lin: Sp 4 pag 51)

Son origine vient du cap de bonne espérance.

elle est vivace

(triandrie monogynie)

2

## Le Petit Talictrum

talictrum minus.

297

# ixia

*ixia ampla coccinea*

299

# ixia

ixia aureo maculato,

301

# Talictrum
# a Feuille D'ancolie

talictrum aquilegiæ=folium (Lin Sp. 2 p 770)

Elle est commune en Suisse.

elle est vivace

(polijandrie polijgijne)
(4 petales 60 etamines 16 pistiles)

# Ananas

ananas fructu piramidato ex viridi flaves=
=cente.

305
1
2

1

## Lichnis

2

## Biscutella

biscutella auriculata (linnaeus sp. pl. 911)
biscutella calycibus nectario utrinque gibbis Sili=
=culis in Stylum coëntibus. (royen. lugd batav 336)
thlaspidium biscutatum villosum flore calcari
donato — - - - - - (bauhin pin 107)

Son origine vient d'italie et de la provence ou
elle croit abondamment sans culture
elle est annuelle
(tetradynamie siliculeuse)

307

# Tordÿlium de Sÿrie

tordÿlium Sÿriacum. (Lin Sp i pag 345)
tordÿlium involucris umbella longioribus
[hortus Cliffortianus 90]
tordÿlium Sÿriacum humilius Semine granu=
=lato majore. [morisson hist 3. p 317]
gingidium foliis pastinacæ latifoliæ [bauhin pin 151]

Son origine vient de Sÿrie où elle croît abondamment Sans culture.

elle est annuelle

(pentandrie digÿnie)

309

# Clematis

clematis integrifolia (Lin Sp 12 pag 767)

Elle est commune en hongrïe et dans la tartarie.

elle est annuelle

(polijandrie poligijnie)

311
1
2

1
# Brunella

prunella laciniata (Lin Sp 2 pag 837)

elle est vivace

(didynamie gymnospermie)

2
# Melinet

cerinthe major flore albo et purpureo
cerinthe major -- (Linnaei Spec )

elle est annuelle

(pentandrie monogyne)

313

1

2

I

# Astragale

astragalus flore flavo.

Les tiges de cette plante ne s'élèvent qu'à la hauteur de la main environ, elles sont creuses, souvent rougeâtres; ses fleurs sont quelquefois purpurines, quelquefois blan=ches, il leur succède des gousses longuettes, rondes, dou=bles, rougeâtres, remplies de semences qui ont la figure d'un rein, sa racine est longue d'environ pied et demi, blanche en dedans, douce au goût,

cette plante croît en païs chauds, sur les chemins,

Sa racine et ses semences arretent le cours de ventre et excitent l'urine.

2

# Silene Nocturna

silene nocturna - - - - - - - (linnaeus 4 pag) 595

Silene foliis lanceolatis, caule ramoso, et floribus se=
=cundis erectis, calicibus hirsutis. (voijen lugd bat. 447)

lichnis silvestris nocturna pilosa, floribus unius ordinis
dilute purpureis - - (raius supplementum 480)

Son origine vient de l'italie

elle est annuelle.
(decandrie trigijne)

315

1

Briza Minor

*briza minor.*

2

Lÿchnis atrape-Mouche

*lijchnis muscipula.*

317

I

2

I

## immortelle

gnaphalium obtusifolium. (Lin Sp 32 p:1198)
gnaphalium foliis lanceolatis, caule tomentoso, corijmbis supra decompositis, floribus sessilibus, confertis ---------- (gronovius virg 851)
elichrijsum obtusifolium, capitulis argenteis con=globatis ------------ (dillenius eltamensis 130)
Son origine vient de la virginie cont. de l'amé=rique ou elle croit communement sans culture.
(Sijngénésie poliјgamie superflue)

2

## Violier en arbre

viola arborescens. - - - - ( cam epit 911 )
viola martia arborescens purpurea. (b: p: 199)
viola erecta flore caeruleo et albo. (moris hist: 2 p: 476)
viola montana (Lin Sp 11 pag 1325)
Son origine vient des alpes, montagnes d'europes qui separent l'italie de la france et de l'allemagne.

elle est vivace

(Sijngénésie monogamie)

319

# Pervanche a Fleur Blanche

*vinca pervinca flore albo*

321

# Pivoine

*poeonia folio tenuissimo flore rubro simplex.*

323

# Buglosse
## a Feuille argentée

*buglossum foliis argentatis.*

325

# Rameaux d'or
# a Fleur Simple

*Leucoium flore magno Simplici, luteo et purpureo.*

327

328

# Muguet
# a Fleur Double

*lilium convalium flore duplici*

# Pavot Orientale

papaver orientalis. (lin sp. page 727)
papaver capsulis glabris, caulibus unifloris sca=
=bris foliosis, foliis pinnatis serratis [hort ups 136]
papaver foliis pinnatis, fructu globoso. [roy lugdb 279]
papaver orientale hirsutissimum, flore magno [tourn cor 17.]

Son origine vient de l'orient ou elle nait sans culture

elle est annuelle.

(polygamie monogyne)
(16 stigmates)

321

# Fraxinelle
# a Fleurs Blanches

*frasinella flore albo.*

Cette plante ne differt du dictam blanc que par lacouleur de sa fleur qui est entierement blanche, autieu que la fleur du dictam blanc est decouleur blanche tirant sur le purpurin et rayée d'un pur=purin plus foncé, et que ses étamines sont decouleur purpurines

Elle a lamême vertu quele dictam blanc.

on sçait que lors que la fraxinelle est sur pied dans un état de maturité convenable, elle exhale a l'en=trée delanuit une vapeur qui s'enflamme aussi=tôt qu'on approche une bougie alumée, il est vrai=semblable que c'est l'huile étherée qui se dissipe delaplante et forme un athmosphere autour d'elle

330
1
2

1

## Souchet Faux

cyperoïdes, carex, **Ou Léche**

Sa tige s'éléve a la hauteur d'environ trois pieds, sans noeuds, ses fleurs sont attachées entre les écailles des épis, elles sont a étamines de couleurs rousses, ces fleurs ne laissent rien après elles, mais les épis qui sont en dessous portent des semences et ne fleurissent point, ces graines naissent sous les écailles qui composent les épis, ces graines sont triangulaires, et renfermées dans une capsule membraneuse, ses racines ressemblent a celles du ciperus long, elle croit aux lieux aquatiques sa vertus approche de celle du cyperus.

2

## Valeriane a Fleur Rouge

Valeriana flore rubro.

I
2

1

## antriscus

antriscus flore albo.

2

## Trèfle a fleurs incarnates

trifolium incarnatum.
trifolium fruticans flore purpureo.

( diadelphie decandrie )

337

2

1

I

# Gratiole

gratiola officinalis — (Lin Sp 1 pag 24)
gratiola. (i b:) gratiola centauroïdes. (c: b)
digitalis minima gratiola dicta. (tournefort. moris)
gratia dei, germanis: (lac) limnesium centauroïdes (cor)
gratiola floribus pedunculatis fol lanceolatis serratis (lin Sp 1)

Cette plante est une espéce de digitale qui pousse plusieurs tiges a la hauteur d'un pied, et demi environ il succéde a sa fleur une coque ovale divisée en deux loges qui contiennent des simences ménues ses racines sont grosses comme une plume, longues rampantes, nouées, entourées de fibres, elle croit dans les prèz et les marais.

Elle purge puissamment par haut et par bas, on l'emploije dans l'hidropisie, on la fait prendre en poudre a la dose d'un scrupule jusqu'a une dragme, toute la plante est vulneraire, etant appliquée exterieurement. elle est vivace.
(diandrie monogijnie)

2

# Thlaspi Vivace

thlaspi

1

2

1

## Fumeterre

fumaria Sempervirens flore luteo.

2

## Pied de Lion
## a Feuilles argentées

alchemilla foliis digitalis serratis [ flor lapponica 61 ]
alchemilla alpina - [ lin Sp: 2 ] p 179
alchemilla perennis incana argentea S: Sericea Sa-
=tinum provocans - - - [ moris hist 2 p: 195 ]
tormentilla alpina foliis Sericeo [ bauh pin 326 ]
alchemilla alpina pubescens minor [ tournef inst 508 ]

Son origine vient des alpes ou elle croit Sans culture.
elle est vivace ( tetrandrie monogynie )

1

2

I

## OXYS

oxys bulbosa aethiopica minor folio cordato
flore ex albido purpurascente.
oxalis pedunculis uniflovis caule dichotomo [lin Sp 9]
oxalis incarnata --- (Lin Sp 9 p: 622)
Sa racine est petite, ecailleuse et dure,
Son goût est acide, et sa fleur est près que sans odeur,
il succède a sa fleur une capsule oblongue, penta=
=gone, qui s'ouvre en meurissant en cinq parties, et
laisse voir des semences menües,
elle fleurit près que toute l'été,
elle multiplie par sa semence et sa racine.
son origine vient d'æthiopie. (Decandrie pentagijne)

2

## OXYS

oxijs bulbosa africana rotundi folia caulibus et
floribus purpureis amplis.
oxalis purpurea ---- [lin Sp: 2] pag 621)
Son origine vient du cap de bonne espérance,
sa racine est bulbeuse et garnie de quelques fibres, de
la grosseur d'une noisette, son écorce est dure, brune,
il succède a ses fleurs des capsules divisées en 5 loges,
qui contiennent chacune une semence,
elle fleurit dans ce climat en avril et maij,
elle multiplie par sa semence et par les bulbes de sa
racine, son goût est acide.
on la conserve l'hiver dans la serre. elle est vivace
(decandrie pentagijne)

343

1

2

1

# Anemonoïdes

anemonoïdes flore albo.

2

# Anemonoïdes

anemonoïdes flore luteo.

345

# anemonospermos

anemonospermos plantaginis folio.
anemonospermos africana foliis et facie taraxaci
arctotis tristis. (linnœus 2) p 1306)

Son origine vient d'ethiopie païs de l'afrique
ou elle croit abondamment.

elle est annuelle

(Syngénésie polygamie necessaire)

347

1

2

1

# Hyacinte Monstrueuse

hyacinthus monstrosus. (lin sp 8) pag 454)
hijacinthus floribus paniculis monstrosis [hort cliffortiani 126]
hijacinthus panicula cœrulea [bauh pin 42]
hijacinthus Sannesius, panicula comosa.

elle est vivace

(hexandrie monogyne)

2

# Sçéau de Salomon a Fleur Double

Sigillum Salomonis flore duplici.

349

# Chondrille

Chondrilla perennis humilior flore cœruleo.
(B·I·)

lactuca perennis - ( L: Sp Pag 1120)

lactuca foliis linearibus dentato pinnatis; lacinüs sursum dentatis [horti cliffortiani 384]

chondrilla cœrulea altera, cichorii silvestris folio - - - - - - [c: bauhin pin 130]

Chondrilla - - - [dodon pempt 637]

apate - - - - - - [dalechampii historia 561]

Elle croit en allemagne, en suisse et en france

elle est vivace

(Syngénésie polygamie égale)

351

# Chamæcrista

chamoecrista pavonis major [côm hort p 53 t 37)
chamoecrista pavonis americana, siliqua mul=
=tiplici - - - - - [breijnii centuria 64. t. 24]

cassia foliolis multijugatis glandula petioli pe=
=dicellata, stipulis ensiformibus. [horti upsaliensis 101]
cassia foliolis plurimum parium linearibus sti=
=pulis subulatis [horti cliffortiani 155]
cassia chamoecrista (Lin. Sp. 25 pag 542)

Son origine vient des isles dela jamaiques, des barbades et delavirginie, ou elle croit abondamment sans culture, elle est annuelle.

saracine est petite, blanchâtre, se divisant en plusieurs fibres,

satige s'élève alahauteur d'environ deux pieds.

il succède a ses fleurs des siliques oblongues, pointües, qui renferment des semences rondes, noirâtres et luisantes.

elle est annuelle

(decandrie monogyne)

353

# Potentilla

potentilla arborescens

355

# Bois de Ste Lucie

cerasus silvestris amara mahaleb putata [ j: b: ]
macholeum: ---------- [cord hist ]
chamæcerasus ---- [ dalechamp ]
vaccinium plinii ---- [lugd ]
ceraso affinis ---------- [ c: bauhin ]
mahaleb ------------ [matthiolus ]
macaleb ------------ [lobel ]
prunus mahaleb. (Lin Sp 6 p678 )
C'est une espéce de cérisier sauvage, qui croît aux lieux aquatiques, aux bords des riviéres,
son bois est gris, rougeâtre, agréable alaveuë, c'est ce bois que l'on tire de lorraine, que l'on appelle bois de ste lucie on nous l'apporte de lorraine.

il succede a ses fleurs un fruit rond, noire, amer, peu charnüe, contenant un noijau qui renferme une amande amere, ce fruit teint les mains quand on les ecrases, son amande a une odeur qui approche de la punaise,
la racine de cet arbre est longue, grosse, branchue,

Son bois est sudorifique, on en prend la decoction
(icosandrie monogyne)

357

# alaterne

alaternus seu phillijrea folio ex albo variegato

[ 6: 7 ]

359

# alaterne

alaternus seu phillyrea folio ex luteis va=
=riegatis . . . . . . [ 6: 6 ]

361

# Ronce odorante

rubus odoratus dictus flore eleg purpureo.
[M: io R.I.L.7]
rubus odoratus [lin sp 9] pag 707
rubus foliis simplicibus palmatis caule iner=
=mi multifolio, multifloro. [hort cliffort 192]

Son origine vient du canada.

elle est vivace

(icosandrie poligynie)

363

# Houx

aquifolium echinata Superficie folio, ex luteis & variegatis [ M · 7 ]

365

# Sumac de Virginie

Rhus virginianum (C: Bauhin p: app 517)
Rhus typhinum (Lin Sp 2 pag 380)

Elle croit communement en Virginie)

Elle est vulneraire astringente.

(pentandrie trigynie)

# Le Bouleau.

betula - - - - (dodonæus, Tournef )
arbor sapientiæ -
betula alba (Lin Sp. pag 1393)

Cet arbre est de grandeur mediocre, jette des rameaux menües, flexibles,
l'écorce exterieure de son tronc est grosse, rude, blanchâtre, crevassée, sa seconde est mince, uni, poli comme du parchemin, les anciens s'en servoient au lieu de papier sur laquelle ils écrivoient avec un poinçon
son bois est blanc,
ses feuilles ont un goût amer.
ses chatons ont quelque ressemblance avec le poivre long, ces chatons ne laissent aucun fruit après eux, les fruits naissent sur le même pied du bouleau mais en des endroits differens, ce sont d'abord de petits épis a plusieurs écailles qui deviennent des fruits cilindriques dont les ecailles sont le plus souvent coupés en trefle couvrent chacune une semence bordée de deux aîles.
cet arbre croit dans les bois, aux lieux rudes et humides.
on l'appelle arbor sapientiæ parce qu'il fournit les verges des colleges, il fournit aussi les balais
(monoecie tetrandrie)

369

# Barba Jovis

anthyllis barbajovis (Lin Sp. 1 pag 1013)
barba jovis pulchre lucens . (J: bauhin 385)
barba jovis ............... ([ bauhin pin 397 ]
anthyllis fruticosa foliis pinnatis æqualib: florib capitatis (n: clif:)
anthyllis fruticosa [ lin Sp: 6 ] pag 1013 )

Cet arbrisseau croit aux lieux pierreux, montagneux proche delamer, on envoit beaucoup au port de cette en languedoc,

il croit ordinairement ala hauteur de trois au quatre pieds.

Satige est dure, ligneuse, couverte d'une écorce quelquefois lanugineuse, elle jette beaucoup de rameaux,

Ses fleurs sont petites, lanugineuses, jaunâtres, aijant de la ressemblance a celles du genet,

il leur succede des gousses courtes et presqu'ovales, contenantes chacune une semence.

On la dit aperitive.

(diadelphie decandrie)

371

# Le Hêtre ou Fau.

fagus --- - - - - - - (dodon pempt 832)
oscija - - : - - - - - - - - ( bellon )

Cette arbre croit dans les champs, dans les plaines, aux lieux montagneux un peu humides, il est grand, gros, rameux,
son écorce est mediocrement grosse, unie, de cou=
=leur grise cendrée;
Son bois est dur, blanc,
Ses feuilles sont minces et douces au toucher.
Ses fleurs sont des clochés dentelées en leur bords, et du fond desquelles s'élèvent quelques étamines.
ces fleurs sont ramassées en chatons arondies, ou en pelotons de couleur jaune, elles ne laissent rien après elles, les fruits naissent sur le meme pied mais en des endroits séparés des chatons.
ce fruit est dur comme du cuir, herissées de pointes mais moins piquantes que dans les châtaignes, il s'ou=
=vre par la pointe en 4 partie, et renferme or=
=dinairement deux semences ou noisettes qu'on appelle <u>fouesnes</u> il est bon a manger.
<u>Ses feuilles sont astringentes et rafraichissantes</u> on employe sa decoction pour les maux de gorge
Ses semences sont adoucissantes, on en tire une huile par expression qui a la qualité de celle des avelines

373

# AmeLanchier

Diospijros - - - - - - - - - - - - ( j: bauhin )
vitis idea tertia clusii.
vaccinia alba - - - - - - - - ( gerardus )
mespilus folio rotundiori fructu nigro subdulci ( J )
mijrtomelis - - - - - - - - - - ( gesnerus )
mespilus amelanchier ( Lin sp 4 pag 685 )
Cet arbrisseau croit aux lieux rudes montagneux, et pierreux, dans les bois. il y en a beaucoup en brabant
il pousse de sa racine plusieurs tiges a la hauteur d'un homme, rameuses, couvertes d'une écorce rou=geâtre,
Ses fleurs sont blanches, composés de cinq feuilles oblongues, près que sans odeur.
Ses baijes ont un goût doux, agréable. on les appelle <u>cousines</u>

Son fruit est stomacal et cordiale.
Il ija un autre espéce d'arbrisseau qui ressemble beaucoup a celuij ci qu'el'on nomme airelle ou mirtille dodonée l'appelle <u>vaccinia nigra</u> matthiole, <u>mirtillus</u> jean bauhin, vitis <u>idea angulosa</u> ses baies sont rafraichissante et astringentes, on l'appelle baie de mir=tille, on les emploije dans les cours de ventre
( icosandrie pentagijnie )

375

# Caroubier Mâle

*Siliqua edulis mas.*

377

# Guajava

guajava alba dulcis ( pār bat prod )
pela - - - - - - - - ( hort malab tom. 3. )
psidium pyriferum ( Lin sp i pag 672 )

Elle croît communement aux indes.
Ses fleurs sont inodores,
la chair de son fruit est blanche, mêlé d'un peu de jaune, succulente, d'un goût douceâtre.

Ses semences sont blanches, anguleuses quelque fois rondelettes, et ont quelque fois la figure d'un rein.

( icosandrie monogyne )

379

# Viorne D'amérique

Viburnum americanum urticæ foliis lamii odore floribus miniatis

Camara tinga pisonis.
lantana camara (Lin Sp 4 pag 874)

Son origine vient de l'amérique,

Ses racines sont ligneuses, blanches, jettant beaucoup de fibres capillaires,

Sa tige s'élève a la hauteur de trois pieds, grosse comme le pouce, anguleuse,

Ses feuilles sont ~~véluës~~ et ont l'odeur du lamium.

Ses fleurs sont monopetales. et n'ont pas de mauvaises odeur.

elle fleurit en été.

il succede a sa fleur une baie peu succulen=te, contenante une seule semence.

(didynamie angiospermie)

381

# Jasmin D'arabie

gelseminum arabicum

383

# Jasmin D'azores

jasminum azoricum trifoliatum flore albo odo=
=ratissimo.
jasminum azoricum Lin. sp. 3 pag. 9.

Son origine vient des isles azores
cet arbre est toujours verd.
Ses racines sont blanches et poussent beaucoup
de fibres capillaires.
Son écorce est grisâtre.
Ses fleurs ont une odeur très suave.
il fleurit en aout.
il aime la grande chaleur

(diandrie monogyne)

385

# Neflier D'amérique

mespilus americanus laurifolio, glabra, fructu rubro mucilaginoso.
ehretia bourreria (Lin Sp 3. pag 275)

C'est un arbre de l'amerique qui s'éleve alahauteur d'un poirier,

il Succéde a Ses fleurs des fruits qui contiennent une pulpe molle, rouge et mucilagineuse, contenant quatre Semences triangulaires jointes ensemble.

(pentandrie monogyne)

387

# Tithÿmale

tithijmalus arboreus americanus cotini folio. ----- [cat hort med amst]
euphorbia cotini-folia (Lin Sp pl pag 650)

Son origine vient de l'isle curacao *

Sa racine est ligneuse, blanche, fibreuse, empreinte d'un suc laiteux comme le reste de la plante.

elle fleurit en juillet.

il succede a ses fleurs une capsule trian=gulaire qui contient trois semences.

ses feuilles tombent en hiver.

on la met en serre pendant la gelée.

son suc est âcre et occasione des douleurs atroces avec inflammation.

* isle de l'amerique.
le commerce de cet isle consiste en sucre, laine et cuivre. elle appartient aux hollandois.

(dodecandrie trigijnie)

389

# Aloë de Zéïlan

aloë Zeilanica pumila foliis variegatis
[parad bat prod ]

Sa racine est rougeâtre exterieurement et
blanche interieurement, assez grosse.

elle produit beaucoup par rejettons

391

# Aloë-Pouce-écrasé

aloë africana brevissimo crassissimoque folio flore subviridi.
aloë retusa [lin sp: 5] pag 459)

Son origine vient d'afrique.

sa racine est fibreuse et de couleur brune.

Ses feuilles sont épaisses a leurs bases plus plattes vers le bout cequi a fait donner a cette plante lenom de pouce écrasé.

lesuc est d'un goût doux et aqueux.

elle fleurit en Septembre dans nos jardins.

elle croit sans culture aux lieux pierreux ducap de bonne esperance ou elle fleurit au mois d'octobre.

elle multiplie facilement en exposant un jour ou deux sa feuille au soleil, puis la mettant amoitié en terre elle produit une nouvelle plante.

(hexandrie monogyne)

393

# Plante Lactifere D'afrique

planta lactifera africana.
tithimali forte genus, planta lactaria africana
pini fructuum facie

Cette plante croit aux lieux arides du cap de
bonne espérance,
Saracine est grosse comme une plume a écrire
jettant beaucoup de fibres,
Satige est grosse comme le poingt
toute laplante rend un suc laiteux.

395

# Aloë D'afrique en arbre

aloë arborescens africana

Son origine vient d'afrique
Satige est noueuse, de la grosseur du pouce,

elle craint les rigueurs de l'hiver.

397

# aloë D'afrique

aloës africana folio triangulo longissimo et angustissimo, floribus luteis foetidis.
aloë floribus sessilib reflexis imbricatis, prismaticis.
aloë uvaria —— . —. (lin sp 8) pag 460)

Son origine vient du cap de bonne esperan=
=ce

Sa racine ~~est~~ a des fibres grosse, comme le tuyau d'une plume a écrire longues de deux ou trois pieds

Ses feuilles sont longues de quatre a cinq pieds.

Sa tige est ronde, molle, et s'élève a la même hauteur. des feuilles.

Ses fleurs sont monopétales et ont une mau=
=vaise odeur.

cette plante étant bien cultivée fleurit tous les ans.

(hexandrie monogyne)

399

# Sedum

Sedum canarinum foliis omnium maximis

Sedum majus canarinum acaulon, pilis ad oras foliorum hispidis — [pluKenetii almagestum 340 t. 314. f. 1]

Sempervivum canariense — [lin Sp 2]

Sempervivum caule foliorum rudimentis lacero, foliis retulis.

Sempervivum caule infra folia lacero, foliis cuneiformibus: summis subrotundis [hort clif 179]

Son origine vient des isles de canarie.
Sa racine est fibreuse,
Ses feuilles ont un goût insipide.

elle aime la culture des [illegible]

(dodecandrie dodecagyne)

401

# Ficoides

ficoides africana frutescens perfoliata folio triangulari glauco punctato.

Son origine vient d'afrique.

403

# Ficoides

ficoïdes africana humilis folio triangulari breviori non nihil spinoso seu denticulato.

404

# Ficoides

ficoïdes africana folio tereti erectum flore flammei coloris intus, extus ad solem aureo fulgo=re splendente.

407

# Ficoïdes

ficoides africana, aculeis longissimis et
foliolis nascentibus ex foliorum alis

mesembryanthemum spinis ramosis (h: clif 216)
mesembryanthemum spinosum (lin sp: 18) p 693)

Son origine vient d'afrique.

(icosandrie pentagyne)

409

410

Ficoïdes

411

417

Ficoïdes

413

# Ficoïdes

ficoïdes caule hispido, foliis subulatis, bellidi floribus rubicundis.

415

# Ficoïdes

mesembrijanthemum tenuifolium. [lin Sp 20] 693)
mesembrijanthemum foliis subulatis semitere=
=tibus, glabris, internodiis longioribus.
ficoides capensis humilis teretifolia, flore
coccineo.
ficoides africana minor, procumbens
folio tenuiore viridi, flore coccineo [moris. h: 3 p 507]

Son origine vient d'afrique.

(icosandrie pentagynie)

417

1

## Ficoïdes

2

## Ficoïdes

*ficoides flore radiaby rubro, folio longo extre=
=mitate purpureo.*

419

420

Ficoïdes

421

# Ficoïdes

mesembryanthemum bellidiflorum (linn sp. 20] p 690)
mesembryanthemum foliis triquetris bellidiflori=
=bus rubris pallidis

Son origine vient d'afrique

(icosandrie pentagynie)

423

# Ficoïdes

425

# Ficoïdes

427

# Ficoides

ficoides triquetri folio flore luteo.

# Ficoïdes

ficoïdes Scolopendriæ folio.

Sa fleur est polijpetale.

491

# Ficoides

ficoides folio aspero maculis albis notato
Stella Spinosa in Summitate ornato.
ficoides folio tumido extremitate Stellata.

433

Ficoïdes

495



## Sedum

Sedum africanum arborescens folio, pallide luteo. - - - - - - - - - [M:11]

# TABLE
## Des Noms Français


| | | | |
|---|---|---|---|
| A | | aster | 93 |
| airelle | 373 | aster d'afrique. 235. 237. | 239 |
| alaterne ~~357~~ et | 359 | astragale | 313 |
| alcea d'amerique | 231 | atropha | 291 |
| alcea de Surinam | ibid | atrape mouche | 45. |
| alcea de bengale | 233 | | |
| alkekenge | 13 | | |
| aloë d'afrique | 397 | B | |
| aloë de Zeïlan | 389 | balsamine des indes | 241 |
| aloë pouce écrasé | 391 | barbe de jupiter | 369 |
| aloë d'afrique en arbre | 395 | bellevedere | 95 |
| alysson blanc | 9 | biscutella | 305 |
| amarillus | 153 | bistorte globulifer | 27 |
| amelanchier | 373 | bouleau | 367 |
| anagallis | 31 | bois de Ste lucie | 355 |
| ananas | 303 | brunelle | 311 |
| androsace | 73 | briza (legrand) | 315 |
| anemonoïdes | 343 | buglosse a feuilles argentées | 323 |
| anemonos permos | 345 | buphthalmum maritime | 15. |
| antriscus | 335 | | |
| arbrisseau d'afrique | 177 | | |

## C

| | |
|---|---|
| campanule — | 71 |
| campanule d'afrique 209 – 211. 213. 215. et | 217 |
| camphorata d'afrique | 219 |
| capucine a fleur double | 51 |
| cardinale a fleur rouge | 11 |
| catananee — | 29 |
| cerastium — | 43 |
| chamaecrista — | 351 |
| chardon — | 101 |
| chenopodium — | 47 |
| chondrilla — | 349 |
| cistus — | 221 |
| clematis — | 309 |
| coma aurea d'afrique 197. 199. 201. et | 203 |
| cotula a feuille de coronopus — | 53 |
| coussines — | 373 |
| cynoglosse a feuilles de lin — | 57 |
| cytise de canarie — | 205 |
| caroubier mâle — | 375 |

## D

| | |
|---|---|
| Dracocephalon — | 97 |

## E

| | |
|---|---|
| elichrysum dafrique 173 | 175 |

## F

| | |
|---|---|
| faux (le) — | 371 |
| ficoïdes — 401 et | 403 |
| flox — | 3 |
| frascinelle a fleur blanche | 331 |
| fumeterre — | 339 |

## G

| | |
|---|---|
| geranium 245 a — | 255 |
| geranium panaché des forests | 261 |
| geranium a fleur couleur de rose — 265 et | 267 |
| geranium a feuille de vigne — | 257 |
| geranium 259 et | 263 |
| glaucium a fleur violette | 55 |
| guajava — | 377 |
| gramen — | 49 |
| gratiole — | 337 |

## H

| | |
|---|---|
| hêtre (le) — | 371 |
| hyacinte d'afrique — | 169 |

hieracium 21 — 41 et 75
houx (le) — — — 363
hijacinte monstrueuse — 347
hijpericum de canarie — 179

## J

jacobé d'afrique 181 a 193
jasmin d'arabie — — 381
jasmin d'azores — — 383
immortelle — — — 317
iris — — — — — 269
iris mort-lion — — 275
iris feuille-morte 271 et 273
iris polijmnestre 285.287. 289
iris roij du perou bleüe 279 281 et 283
iris feuille morte croon — 277
ixia — — 295 — 297. et 299

## K

Katou Karva — — — 147

## L

leche — — — — — 333
leonurus — — — — 23
lichnis — — — — 305
lilio narcisse de zeilan — 151
lotier argenté — — 25
lotier de l'isle st jaque 167
lichnis des indes — 169
lichnis atrape-mouche 45 — 315
lijs de st jacque — — 155
lijs de ceïlan — — 149

## M

martinia — — — — 109
matricaire a fleur double 77
matricaire a feuille frisée 79
medicago 81. 83. 85
melinet — — — — 311
mirtille — — — — 373
monarda a fleur jaune 7
muguet a fleur double 327

## N

narcisse d'amerique 161
narcisse d'amboine 159
narcisse de ceilan 157
neflier d'amerique — 385

## O

onotera — — — 93
ornitogalum d'afrique 171 —

oseille d'amerique — — 87
oxiys — — — — — — — 341

P

pain acoucou d'éthiopie 91
patiences demer — — — 103
pavot orientale — — 329
pervenche a fleur blanche 319
pied delion a feuille argentée 339
pimpernelle (grande) du canada — — 107
pivoine — — — — — — 321
plante lactifere d'afrique — 393
pois chiche blanc — — — 37
polycarpon — — — — — — 91
potentilla — 135 — — et 353
pourpier — — — — — — 227
pourpier d'amerique — 275
pourpier d'afrique — — — 223

R

rameaux d'or a fleur Simple 325
ricin d'amerique — — 243
ronce odorante — — — 361
rudbeckia — — — — — 105
rut de chévre a fleur blanche 1

S

Sauge tricolor — — 89
Scabieuse 111 a — 131
Scabieuse du Kraine — 115
S. au de Salomon a fl. double 347
Sedum — — — — — — 399
Silene — — 133 et 313
Solanum d'afrique — 195
Souchet faux — — — 333
Spartium d'afrique — 229
Stachis — — — — — — 39
Sumac de Virginie — 365

T

talictrum (petit) — 295
talictrum a feuille d'ancolie 301
tanesie d'afrique 137 et 139
thlaspie vivace — — 337
thlaspi des champs — 59
tithymale 207 et 387
tithymale a feuille de pin 293
tordylium de Sirie — 307
trefle d'afrique — 141 et 149
trefle a fleur incarnate 335

| | | | |
|---|---|---|---|
| V Valeriane a fleur rouge | 333 | Veronique batarde a fleur bleuë — | 17 |
| Valerianelle d'afrique | 145 | Violier - - - - - | 5 |
| Verge d'or du mexique | 99 | Violier en arbre — | 317 |
| Verveine d'amerique | 147 | Viorne d'amerique | 379 |
| Veronique batarde a fleur blanche | 17 | | |



# TABLE
## Des Noms Latins



A

| | |
|---|---|
| alaternus seu phillyrea folio ex albo variegato | 357 |
| alaternus seu phillyrea folio ex luteo variegato | 359 |
| alkekengi bonariensis bacca turbinata physalis | 13 |
| alcea americana annua flore albo maximo, fructu maximo pyramidali sulcato - - - - - - - - | 231 |
| alcea bengalensis spinosissima acetosa sapore flore luteopallido umbone purpurascente - - - - | 233 |
| alchemilla alpina - - - - - - - - - - | 339 |
| alchemilla perennis incana argentea - - - - | ibid |
| alchemilla alpina pubescens minor - - - - | ibid |
| alchemilla foliis digitis serratis - - - - - | ibid |
| aloë uvaria - - - - - - - - - - | 397 |
| aloë retusa - - - - - - - - - - | 391 |
| aloe arborescens africana - - - - - - - - | 395 |
| aloe zeilanica pumilla foliis variegatis - - - - | 389 |

| | |
|---|---|
| aloe africana brevissimo crassissimoque folio, flore subviridi | 391 |
| aloe africana folio triangulo longissimo et angustissimo, floribus luteis foetidis | 397 |
| aloe floribus sessilibus reflexis imbricatis primaticis | ibid |
| alijsson album | 9 |
| amarillis formosissima | 155 |
| amarijllis spartha uniflora corolla inaequali genitalibus declinatis | ibid |
| amarijllus lilionarcissus indicus flore exalbo exterius rubente | 153 |
| anagallis monelli | 31 |
| ananas fructu pijramidato ex viridi flavescente | 303 |
| anemonoides flore albo | 343 |
| anemonoides flore luteo | ibid |
| anemonospermos plantaginis folio | 345 |
| anemonospermos africana foliis et facie taraxaci | ibid |
| androsace maxima | 73 |
| anthijllis fruticosa | 369 |
| anthijllis fruticosa foliis pinnatis aequalibus, floribus capitatis | ibid |
| antriscus flore albo | 335 |
| apate | 349 |
| aquifolium echinata superficie folio, ex luteis variegatis | 363 |
| arbor sapientia | 367 |
| arctotis tristis | 345 |

| | |
|---|---|
| aster annuus | 93 |
| aster africanus frutiscens lavendulæ folio flore purpureo | 239 |
| aster africanus fruticans splendentibus parvis et reflexis foliis | 237 |
| aster africanus frutiscens foliis angustis plerumque conjunctis | 235 |
| astragalus flore flavo | 312 |
| atriplex fructu mori | 47 |
| atropha | 291 |
| atropha americana flore cœruleo | ibid |



## B



| | |
|---|---|
| balsamina cucumerina indica fructu majore flavescente | 241 |
| barba jovis | 369 |
| barba jovis pulchre lucens | ibid |
| betula | 367 |
| bellis ramosa umbellifera cornuti canadense | 90 |
| biscutella | 305 |
| biscutella auriculata | ibid |
| biscutella calijcibus nectario utrimque gibbis siliculis in stilum coeuntibus | ibid |
| bistorta globulifera | 27 |
| briza minor | 215 |
| brunella laciniata | 311 |
| buglossum foliis argentatis | 322 |
| buphthalmum maritimum | 157 |

# C

camaratinga pisonis — — — — — — — — 379
Campanula Speculum veneris dicta fl: caerulea. 71
Campanula africana frutescens aculeosa flore violaceo — — — — — — — — — — 217
Campanula africana annua latis serratis que foliis flore magno violaceo — — — — 209
Campanula africana annua glabra serrato folio flore pallido — — — — — — — — 211
Campanula africana hirsuta parvo angustoque folio flore pallido violaceo — — — — 213
Campanula africana annua angustifolio — flore purpurascente major — — — — — — — 215
campanula africana frutescens aculeata flore violaceo 217
camphorata africana umbellata frutescens hermani. 219
cardamindum flore duplici — — — — — — — — 51
carduus eriophorus — — — — — — — — 101
Cassia foliolis plurimum parium linearibus stipulis subulatis — — — — — — — — — — 351
cassia foliolis multijugatis glandula petioli pedicel=lata stipulis ensiformis — — — — — — — — ibid
catananace caerulea — — — — — — — — — — 29
cerastium perfoliatum — — — — — — — — 43
cerasus silvestris amara mahaleb putata — 355
Ceraso affinis — — — — — — — — — — ibid
cerinthe — — — — — — — — — — — — 34
chamaecerasus — — — — — — — — — — 355
chamaecrista — — — — — — — — — — — 351

| | |
|---|---|
| chamaecrista perennis major - - - - - - - | 351 |
| chamaecrista pavonis americana Siliqua multiplici | ibid |
| chenopodium virgatum - - - - - - - - - - - - | 47 |
| chenopodimorus minor - - - - - - - - - - | ibid |
| chenopodium linifolio - - - - - - - - - | 57 |
| chondrilla - - - - - - - - - - - - - - | 349 |
| chondrilla perennis humilior flore coeruleo - - - - | ibid |
| chondrilla coerulea altera cichorii Silvestri - - | ibid |
| chrysanthemum cannabinum virginianum hispi=tum, disco magno, petalis aureis radiato - - | 105 |
| chrysanthemum annuum majus virginianum foliis laciniatis et hirsutis umbone nigricante - - - | ibid |
| cotula coronopi folio - - - - - - - - - - - | 53 |
| cicer arietinum album - - - - - - - - - - - | 37 |
| cistus ledon flore macula nigricante notato - - - | 221 |
| clematis recta - - - - - - - - - - - - - - | 309 |
| coma aurea africana fruticans ericaefolio - - - - | 199 |
| coma aurea africana fruticans foliis crithmi marini | 203 |
| coma aurea fruticans omnium maxima foliis to=mentosis et incanis - - - - - - - - - - - - | 197 |
| coma aurea africana fruticans foliis glaucio et in extremitate trifidis - - - - - - - - - - - | 201 |
| cynoglossum lini-folio - - - - - - - - - - - - | 57 |
| cyperoides carex - - - - - - - - - - - - - - | 333 |
| cytisus canariensis semper virens et incanis - - | 205 |

## D


| | |
|---|---|
| digitalis minima gratiola dicta - - - - - - | 337 |
| dyospiros - - - - - - - - - - - - - - - - | 373 |
| dracocephalum canescens - - - - - - - - - | 97 |
| dracocephalum floribus verticillatis foliis lanceolatis floribus oblongis - - - - - - - - - - - | ibid |
| dracocephalum floribus verticillatis bracteis oblongis serratis spinosis foliis subtomentosis - - - - | ibid |


## E


| | |
|---|---|
| echium africanum frutescens foliis pilosis - - - - - | 208 |
| echium africanum fruticans foliis pilosis - - - | ibid |
| echium fruticosum - - - - - - - - - - - - - - | ibid |
| elichrisum africanum frutescens foliis chrithmi marini - - - - - - - - - - - - - - | 175 |
| elichrysum africanum latifolium foetidum capitulo aureo - - - - - - - - - - - - | 173 |
| eliChrysum obtusi folium capitulis argenteis conglobatis | 317 |


## F


| | |
|---|---|
| fagus - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 371 |
| ficoides. 409. 411. 417. 419 421. 423. 425. et | 433. |
| ficoides scolopendriæ folio. - - - - - - - - - - | 429 |
| ficoides triquetri folio, flore luteo. - - - - - - | 427 |
| ficoides folio tumido extremitate stellata - - - - | 431 |
| ficoides capensis humilis teretifolia flore coccineo - - | 415 |

| | |
|---|---|
| ficoides africana frutescens perfoliata folio triangu=lari glauco punctato - - - - - - - - - | 401 |
| ficoides africana humilis folio triangulari breviori non nihil spinoso seu denticulato - - - - - - | 403 |
| ficoides africana folio tereti erectum flore flammei coloris intus, extus ad solem aureo fulgore splendente - - - - - - - - - - - - - | 405 |
| ficoides africana aculeis longissimis et foliolis nascentibus ex foliorum alis - - - - - - | 407 |
| ficoides caule hispido foliis subulatis bellissi flo=ribus rubicundis - - - - - - - - - - - - - | 413 |
| ficoides africana minor procumbens folio tenuiore viride flore coccineo - - - - - - - - - | 415 |
| ficoides flore radiato rubro, folio longo, extremi=tate purpureo - - - - - - - - - - - - | 417 |
| ficoides folio aspero, maculis albis notato stella spinosa in summitate ornato - - - - - - | 431 |
| flore - - - - - - - - - - - - - - - - - | 3 |
| fraxinella flore albo - - - - - - - - - - - | 331 |
| frutex africanus ericae folio glutinosus flore spicato albo - - - - - - - - - - - - | 177 |
| fumaria sempervirens flore luteo - - - - - - | 339 |


## G


| | |
|---|---|
| galega flore albo - - - - - | 1 |
| gelseminum arabicum - - - - - - - - | 381 |
| genista africana glomerato flore luteo - - - | 143 |
| geranium biflorum - - - - - - - - - - | 147 |

| | |
|---|---|
| geranium gruinum - - - - - - - - - - - | 267 |
| geranium flore roseo - - - - - - - - - | 265 |
| geranium batrachoides - - - - - - - - - | 259 |
| geranium folio malvæ maculato - - - - - | 263 |
| geranium silvaticum paniculatum - - - - - | 261 |
| geranium noctu olens vitis folio - - - - - - | 257 |
| geranium anemone folio flore rubello - - - - | 255 |
| geranium folio malvæ laciniato odore melissæ - | 245 |
| geranium africanum fruticans malvæ folio lacinia=to odorato - - - - - - - - - - | ibid |
| geranium americanum arborescens vitis folio odore melissæ - - - - - - - - - - | ibid |
| geranium pedunculis bifloris hirsutum folio malvæ maculato laciniato - - - - - - | 147 |
| geranium africanum alchimillæ folio hirsuto flore rubro magno - - - - - - - - | 249 |
| geranium africanum frutescens alchimillæ folio floribus rubicundis - - - - - - - - | 251 |
| geranium africanum frutescens alchimillæ folio flore rubello purpureo - - - - - - - - - | 253 |
| geranium africanum noctu olens tuberosum foliis vitis hirsutis - - - - - - - - - | 257 |
| gingidium foliis pastinacæ latifoliæ - - - - | 307 |
| glaucium flore violaceo - - - - - - - - - | 55 |
| glaucium cornutum flore violaceo - - - - - | ibid |

| | |
|---|---|
| gnaphalium obtusi folium | 317 |
| gnaphalium foliis lanceolatis caule tomentoso corym=bis supra decompositis floribus sessilibus con=fertis | idem |
| gramen spicatum junci facie lithospermi semine | 49 |
| gratia dei germanica | 337 |
| gratiola | ibid |
| gratiola centauroides | ibid |
| gratiola floribus pedunculatis foliis lanceolatis serratis | ibid |
| guajava alba dulcis | 377 |

## H

| | |
|---|---|
| hieratium hortensis altissima | 21 |
| hieratium pilosum flore coccinio | 41 |
| hieratium flore suave rubente | 75 |
| hijacinthus monstrosus | 347 |
| hijacinthus panicula caerulea | ibid |
| hijacinthus floribus paniculis monstrosis | ibid |
| hijacinthus sannesius panicula comosa | ibid |
| hijacinthus africanus tuberosus flore caeruleo umbellato | 163 |
| hijpericum frutescens latifolium canariense multi=florum | 179 |

## J

| | |
|---|---|
| Jacobea africana frutescens coronopi folio | 180 |
| jacobea africana frutescens folio longo et glauco | 187 |

| | |
|---|---|
| jacobæa africana hederæ terrestris folio repens | 189 |
| jacobæa africana frutescens crassis et succulentis foliis | 191 |
| jacobæa africana frutescens lavendulæ folio latiori | 185 |
| jacobæa africana frutescens foliis rigidis et hirsutis | 193 |
| jacobæa africana frutescens foliis absinthii umbel=<br>=liferi incanis | 181 |
| jasminum àzoricum trifoliatum flore albo odo=<br>=ratissimo | 383 |
| iris hispanica | 287 |
| iris anglica | 285 |
| iris anglicus | 281 |
| iris gont geele | 269 |
| iris hispanica regina | 283 |
| iris bulbosa folio tetragono | 289 |
| iris virginiana pumilla flore purpureo cæruleo odorato | ibid. |
| ixia amplo coccineo | 297 |
| ixia aureo maculato | 299 |
| ixia caule bulbifera toto albo | 295 |
| **K** | |
| Katou Karva | 147 |
| **L.** | |
| lactuca perennis | 349 |
| lactuca foliis linearibus dentato pinnatis laciniis<br>surfum dentatis | ibid |

| | |
|---|---|
| leonurus cardiaca dictus - - - - - | 23 |
| leucoium flore magno Simplici luteo et purpureo - | 325 |
| lichnis - - - - - - - - - - - - - - - - | 305 |
| lichnis Silvestris nocturna pilosa floribus unius ordinis dilute purpureis - - - - - - - - - - - | 313 |
| lilio narcissus flore Sanguineo nutante - - - - - | 155 |
| lilio narcissus Jacobæus flore Sanguineo nutante | ibid |
| lilionarcissus Zeilanicus latifolius flore niveo externe linea purpurea Striato - - - - - - - | 151 |
| lilium Zeilanicum Superbum - - - - - - - - | 149 |
| lilium convalium flore duplici - - - - - | 327 |
| limnesium centauroides - - - - - - - - | 337 |
| lotus argentea - - - - - - - - - | 25 |
| lotus angustifolia flore luteo purpurascente insula Sancti jacobi - - - - - - - - - - - - - | 167 |
| lychnis muscipula - - - - - 45 et | 315 |
| lychnis indica Spicata ocymastri foliis fructibus lappaceis oblongis radice urente - - | 169 |

## M

| | |
|---|---|
| macaleb - - - - - - - - - - - - - - - | 355 |
| macholeum - - - - - - - - - - | idem |
| mahaleb idem - - - - - - - - - | idem |
| martinia annua flore albo - - - - - - | 109 |
| matricaria flore duplici - - - - - - - | 77 |
| matricaria foliis crispis - - - - - - - | 79 |
| medica flavo flore leguminoso fructu echinato minore foliis cordatis maculatis - - - - | 81 |

| | |
|---|---|
| medica flore luteo leguminoso fructu echinato folio macula fusca | 83 |
| medicago orbicularis | 85 |
| mesembrijanthemum spinosum | 407 |
| mesembrijanthemum spinis ramosis | idem |
| mesembrijanthemum tenuifolium | 415 |
| mesembrijanthemum bellidiflorum | 421 |
| mesembrijanthemum foliis triquetris bellidifloribus rubris pallidis | ibid |
| mesembrijanthemum foliis subulatis semiteretibus glabris internodiis longioribus | 415 |
| mespilus folio rotundiori fructu nigro subdulci | 373 |
| mespilus americanus laurifolio glabra fructu rubro mucilaginoso | 385 |
| mirthillus | 373 |
| moldavica orientalis betonicæ folio flore magno violaceo | 97 |
| monarda flore lutea | 7 |
| myrtomelis | 373 |



## N



| | |
|---|---|
| narcissus jacobæus major | 155 |
| narcissus ceilanicus flore albo exagono odorato | 157 |
| narcissus americanus flore multiplici albo exagono odorato | 161 |

| | |
|---|---|
| narcissus amboinensis folio latissimo rotundo floribus niveis inodoris | 159 |

O

| | |
|---|---|
| onotera biennis | 33 |
| origanum heracleoticum | 35 |
| ornithogalum africanum plantaginis roseo folio radice tuberosa | 171 |
| oxalis purpurea | 341 |
| oxalis pedunculis unifloris caule dicothomis | ibid |
| oxija | 371 |
| oxijs æthiopicus | 91 |
| oxijs bulbosa africana rotundifolia, caulibus et floribus purpureis amplis | 341 |
| oxijs bulbosa æthiopica minor folio cordato flore ex albido purpurascente | ibid |

P

| | |
|---|---|
| papaver orientalis | 329 |
| papaver corniculatum violaceum | 55 |
| papaver foliis pinnatis fructu globoso | 329 |
| papaver orientale hirsutissimum flore magno | ibid |
| papaver capsulis glabris caulibus unifloris scabris foliosis, foliis pinnatis fructu globoso | ibid |
| pela | 377 |
| poeonia folio tenuissimo flore rubro simplici | 321 |
| pimpinella major canadensis | 107 |

| | |
|---|---|
| pimpinella maxima canadensis longius spica — | 107 |
| pimpinella sanguisorba canadensis major spica longiore alba — | ibid |
| planta lactifera africana — | 393 |
| polycarpon tetraphyllum — | 91 |
| potentilla arborescens — | 358 |
| potentilla flore aureo — | 135 |
| potentilla flore pallido — | ibid |
| portulaca africana semper virens flore rubicundo | 223 |
| portulaca americana latifolia erecta floribus albis | 225 |
| portulaca curassavica angusto longoque folio pro=cumbens foliis rubris — | 227 |


## R


| | |
|---|---|
| rapuntium flore rubro — | 11 |
| rhus virginianum — | 365 |
| ricinus tithymaloides americanus lactescens et urens floribus albis — | 243 |
| rubus odoratus — | 361 |
| rubus odoratus dictus flore eleganter purpureo — | ibid |
| rubus foliis simplicibus palmatis caule inermi multifolio, multiflore — | ibid |
| rudbeckia triloba — | 105 |
| rudbeckia foliis trilobis — | ibid |
| rudbeckia foliis dissectis — | ibid |
| rudbeckia foliis inferioribus trilobis superioribus indivisis — | ibid |
| rumex vesicarius — | 87 |
| rumex maritimus — | 103 |

## S


| | |
|---|---|
| Salvia tricolor | 89 |
| Sanguisorba Canadensis | 107 |
| Sanguisorba Spinis longissimis | ibid |
| Scabiosa 111. 113. 117. 121. 123. 125. 127. 129. et | 131 |
| Scabiosa stellata | 119 |
| Scabiosa ukrenaria | 115 |
| Schœnus nigricans | 19 |
| Sedum Semper virens canariense | 399 |
| Sedum africanum arborescens folio pallide luteo | 435 |
| Sedum canarinum foliis omnium maximis | 399 |
| Sedum majus canarinum acaulon pilis ad oras foliorum hispidis | ibid |
| Sedum Sempervivum caule foliorum rudioribus lacero foliis retulis | ibid |
| Sedum Sempervivum caule infra folio lacero foliis cunei formibus, Summis Subrotundis | ibid |
| Sigillum Salomonis flore duplici | 347 |
| Silene nocturna | 313 |
| Silene cerastoides | 333 |
| Silene quinque Vulnera | ibid |
| Silene foliis lanceolatis caule ramoso et floribus Secundis erectis calicibus hirsutis | 313 |
| Solanum lignosum africanum Semper virens laurini foliis | 195 |
| Solidago | 99 |

Spartium africanum frutescens erica folio — 229
Siliqua edulis mas — 375

## T

talictrum minus — 295
talictrum aquilegiæ folio — 311
tanacetum africanum arborescens foliis lavendulæ multifido folio — 139
tanacetum africanum fruticans multiflorum foliis tanaceti vulgaris ~~dolo~~ decuplo minoribus — 137
thlaspi — 337
thlaspi arvense — 59
tithymali forte genus, planta lactaria africana pini fructum facie — 399
tithymalus pini folio — 293
tithymalus arboreus americanus cotini folio — 387
tolabo ceylanacensibus — 151
tordylium Syriacum — 307
tordylium involucris umbella longioribus — ibid
tordylium Syriacum humilius semine granulato majore — ibid
tormentilla alpina foliis siriceo — 339
trifolium incarnatum — 335
trifolium fruticans flore purpureo — ibid
trifolium africanum fruticans foliis incanis flore luteo — 143
trifolium africanum frutescens folio angustiore flore rubente — 141
trifolium floribus flavis fructu echinato folio leviter dentato macula fusca — 83

## V


| | |
|---|---|
| Vaccinia alba | 373 |
| Vaccinia nigra matthioli | ibid |
| Vaccinium plinii | 355 |
| Valeriana flore rubro | 333 |
| Valerianella africana frutican foliis longis et angustis | 145 |
| Verbena africana veronicæ foliis flore coccineo spicato breijnii | 147 |
| Veronica spuria flore albo | 19 |
| Veronica spuria flore cæruleo | 17 |
| Viburnum americanum urticæ foliis lamii odore floribus miniatis | 379 |
| Vinca pervinca flore albo | 319 |
| Viola arborescens | 317 |
| Viola fruticosa | 5 |
| Viola martia arborescens purpurea | 317 |
| Viola erecta flore cæruleo et albo | ibid |
| Virga aurea maxima limonii folio | 39 |
| Vitis idæa angulosa | 373 |
| Vitis idæa tertia clusii | ibid |

RECUEI
DES
PLANTE

TOM-IX